



Izovac LA SOTA

Vaccin vivant lyophilisé contre
la maladie de Newcastle



Composition Chaque dose du vaccin contient :
Virus atténué de la Maladie de Newcastle souche La Sota > 10⁶ EID₅₀

Indications Vaccination contre la Maladie de Newcastle

Posologie *Administré dans l'eau de boisson.*
Le vaccin est administré à 21-28 jours d'âge et chaque 2-3 mois chez les poules pondeuses et les reproducteurs.
Le vaccin Izovac B1 Hitchner doit être utilisé à 1 jour d'âge.

Mode d'administration

Via	Age des animaux		
	1 - 15 j	15 - 30j	30 j
Eau de boisson (1000)	5 - 10 l	10 - 20 l	20 - 40 l

Dans l'eau de boisson:

- 1- suspendre l'administration d'eau de boisson 2-3 heures avant la vaccination.
- 2- les abreuvoirs doivent être vides, propres, sans traces de désinfectants.
- 3- préparer en fonction du nombre d'animaux dans un container propre (sans désinfectant) la quantité d'eau nécessaire pour l'administration du vaccin. 1000poules de 15 semaines d'âge nécessitent 20-40 l d'eau (max.: été ; min.: hiver)
- 4- tous les animaux doivent avoir accès aux abreuvoirs au même temps.
- 5- la dilution finale dans l'eau de boisson doit être effectuée rapidement.
- 6- l'eau de boisson doit être épuisée dans une période de 1 à 2 heures.
- 7- ne pas exposer l'eau contenant le vaccin à des sources de chaleur.
- 8- utiliser une eau ne contenant pas de chlore ou des traces de désinfectant.
- 9 - le lait en poudre écrémé peut être ajouté dans l'eau de boisson (2 à 3 g/l).

Délais d'attente Néant

Conditions de stockage Stocker à des températures de +2 à +6°C.
Ne pas congeler

Présentations Flacon de 1000 doses. Boite de 10 flacons de 1000 doses.