



# Izovac ND

Vaccin inactivé émulsifié contre  
la maladie de Newcastle



---

## Composition

Chaque dose de 0.5 ml du vaccin contient : Virus inactivé de la maladie de Newcastle > 50 PD50

---

**Indications** Vaccination contre la maladie de Newcastle.

---

**Posologie** *La dose est de 0.5 ml*

- Injecté en sous-cutané (derrière le cou) ou en intramusculaire (muscles pectoraux) chez les reproducteurs et les poulets de chair
- la première vaccination à 28 jours d'âge, le rappel à 18 semaines d'âge avant la période de ponte.
- la primo-vaccination avec un vaccin vivant contre la maladie de Newcastle est recommandée.

---

## Mode d'administration

- Bien agiter les flacons avant et en cours de l'utilisation
- Mettre les flacons à température de 20°C avant utilisation
- L'injection accidentelle d'émulsion huileuse peut causer des réactions localisées pour lesquelles un avis médical est à prendre en considération.

---

**Délais d'attente** Ne pas abattre les animaux durant les 30 jours qui suivent la vaccination

---

**Conditions de stockage** Stocker à des températures de +2 à +6°C  
Ne pas congeler

---

## Présentation

Flacon de 500 doses (250 ml). Flacons de 1000 doses (500 ml).  
Boîte de 10 flacons de 500 doses. Boîte 10 flacons de 1000 doses