

ANTI-INFECTIEUX



DRAXXIN

Solution injectable antibiotique



Composition

Tulathromycine	100mg
Excipient q.s.p	1 ml

Indications

Traitement et prévention des pathologies respiratoires bovines (PRB) associées à Mannheimia Haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni et Mycoplasma bovis sensibles à la tulathromycine. La présence de la pathologie dans le troupeau doit être établie avant de mettre en place le traitement préventif. Traitement de la kératoconjunctivite infectieuse bovine (KCIB) associée à Moraxella bovis sensible à la tulathromycine

Posologie

Bovins (traitement et prévention) : 2,5 mg/kg de tulathromycine (équivalent à 1ml/40kg) injection unique par voie sous-cutanée. Pour le traitement des bovins pesant plus de 300 kg, diviser la dose de manière à ne pas injecter plus de 7,5 ml au même site d'administration.

Conseil pour une administration correcte : Il est recommandé de traiter les animaux en phase précoce de maladie et d'évaluer la réponse au traitement dans les 48 heures suivant l'injection. Si les signes cliniques de pathologie respiratoire persistent ou augmentent ou en cas de rechute, le traitement doit être changé en utilisant un autre antibiotique jusqu'à ce que les signes cliniques disparaissent. Pour s'assurer d'un dosage correct, le poids de l'animal doit être déterminé aussi précisément que possible pour éviter un surdosage. Pour les flacons multi-doses, il est recommandé d'utiliser une seringue automatique afin de limiter le nombre de percements du bouchon en caoutchouc.

Contre indications

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité des espèces cibles aux macrolides.

Ne pas utiliser simultanément avec d'autres macrolides ou lincosamides.

Ne pas utiliser chez la vache laitière dont le lait est destiné à la consommation humaine.

Ne pas utiliser chez les vaches ou les génisses gravides productrices de lait destiné à la consommation humaine dans les 2 mois précédant le vêlage.

Délais d'attente

Bovins (viande et abats) : 49 jours.

Ne pas utiliser chez la vache laitière dont le lait est destiné à la consommation humaine. Ne pas utiliser chez les vaches ou les génisses gravides productrices de lait destiné à la consommation humaine dans les 2 mois précédant le vêlage.

Conditions de Stockage

Conserver le flacon dans son emballage d'origine à température n'excédant pas 25°C.

Après ouverture : 28 jours. Ne Pas utiliser après la date de péremption figurant sur le flacon.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Présentation

Flacon 50 et 100ml.

N11