

ANTI-INFECTIEUX

HYDRAFORT G



Poudre soluble

Composition

Glucose anhydre : 76 g ; Citrate de Sodium : 5,50 g ; Glutamine : 5,00 g ; Chlorure de sodium : 3,50 g ; Chlorure de Potassium ; Acétate de magnésium : 1,50 g ; Chlorure de Calcium : 1,10 g ; Propionate de Sodium : 1,07 g ; Acétate de Sodium : 0,70 g ; Excipients : qsp 100 g.

Espèces cibles

Veaux, agneaux, poulains et chevaux.

Indications

Prévention et traitement de la déshydratation lors de diarrhées néonatales chez les jeunes ruminants et les équidés.

Complément de la réhydratation par voie intraveineuse.

Posologie

Voie orale (Biberon ou seau) selon la posologie suivante :

- dissoudre le contenu d'un sachet de 100 g dans 1 litre d'eau tiède.
- Distribuer 1 litre par jour dans la phase diarrhéique, pendant 4 à 7 jours, selon l'état de l'animal.

Conditions particulières d'emploi

- distribuer le réhydratant dès les premiers signes de diarrhée.
- Suspendre l'alimentation lactée dès que la phase diarrhéique commence, ne la reprendre qu'après 1 à 3 jours de traitement, lorsque la diarrhée a cessé.
- Le réhydratant pourra être distribué avant la tétée chez les jeunes à la mamelle.

Contre indications

Néant

Délai d'attente

Nul

Conditions de Stockage

A l'abri de la lumière et de la chaleur.

Présentation

Sachet de 100g.



N14