

VACCINS RUMINANTS

NOVOVAC



Suspension injectable pour ruminants

Composition

Anatoxine a de Cl. Perfringens type B*	> 10 UI
Anatoxine b de Cl. Perfringens type D*	> 5 UI
Anatoxine e de Cl. Septicum *	> 2,5 UI
Anatoxine de Cl. novyi *	> 3,5 UI
Anatoxine de Cl. Sordellii*	> 5,0 UI
* Q.S.P. pour induire une réponse immunitaire exprimée en UI d'antitoxine.	
Formaldéhyde (Conservateur)	Max. 1,6 mg/ml
Excipient	qsp 2 ml

Indications

Prévention des entérotoxémies des ruminants par immunisation active.

Posologie

Sous-cutanée; soit en avant soit en arrière de l'épaule pour le bovin, et en arrière du coude ou à la face interne de la cuisse pour ovins et caprins.

Posologie usuelle,

Bovin : 4 ml

Ovin : 2 ml

Caprin : 2 ml

Primo-vaccination: 2 injections espacées de 3 à 4 semaines d'intervalles.

Rappel : une injection annuelle.



Contre indications

Eviter de vacciner les chèvres gestantes.

Précautions d'emploi: Respecter les conditions d'asepsie habituelles. Mettre le flacon à température ambiante avant utilisation. Bien mélanger le flacon avant et durant l'utilisation

Tout flacon entamé doit être utilisé immédiatement et le reliquat doit être détruit.

Ne vacciner que les animaux en bonne santé avec un matériel d'injection stérile.

Effets secondaires : Une légère réaction locale au point d'injection est normale, cet œdème sous-cutané rétrocede en quelques jours. La tolérance des animaux traités est bonne, aucune réaction générale, mais petite réaction locale légère.

Temps d'attente

Viandes et abats : nul.

Conditions de Stockage

A conserver dans l'emballage commercial, entre +2°C et +8°C à l'abri de la lumière.

Tout flacon entamé doit être utilisé immédiatement pour éviter les contaminations et l'altération des constituants du produit.

Présentation

Flacon de 500 ml, 250ml, 100ml, 50ml.

N74