

ANTI-INFECTIEUX



TMP-S

Solution orale Anti-infectieux

Composition

Sulfadiazine	8.335 g
Triméthoprime	1.665 g
Excipient q.s.p	100 ml

Indications

Chez les volailles : Collibacillose, Salmonellose, MRC, Coryza aviaire et Staphylococccles.
Chez les veaux et les agneaux : Entérites, Pneumonies et Arthrites.

Posologie

25 mg/Kg de Sulfadiazine et 5 mg/Kg de Triméthoprime par jour, soit 1.5 ml de TMP-S pour 10 Kg de PV toutes les 12 heures.

Volailles : 2 à 2.5 ml par litre d'eau de boisson par jour pendant 5 à 7 jours.

Veaux : 3 ml pour 10 Kg de PV/j en deux repas espacés de 12 heures, mélangés à l'aliment d'allaitement.

Entérites infectieuses : 4 à 5 jours.

Infections respiratoires : 5 à 6 jours

Salmonelloses : 8 à 10 jours.

Contre indications

- ne pas administrer aux insuffisants rénaux ou aux animaux déshydratés.

- ne pas administrer aux animaux présentant une hypersensibilité aux sulfamides.

- ne pas administrer aux poules pondeuses dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.

Délai d'attente

viande et abats : 12 jours.

Conditions de Stockage

A l'abri de la lumière et de la chaleur.

Présentation

Flacons 1l et 250 ml.



N31