

NUTRITION & METABOLISME



COLVASONE

Solution injectable Anti-inflammatoire

Composition

Dexamethasone 2 mg
Excipient q.s.p. 1 ml

Indications

Colvasone est indiqué chez les bovins, équins, ovins, chiens et chats lors de :
Etats de choc,
Etat allergique,
Syndromes infectieux avec réactions inflammatoires : mammites aiguës, arthrite, fourbure (à l'exclusion du cheval), dermatite,...
Acétonémie (vache)
Toxémie de gestation
Induction de la parturition chez les ruminants.

Posologie

Voie intramusculaire (IM) ou Intraveineuse (IV).
Bovin, Equin, Ovin : 1 ml par 25 Kg de PV.
Chien, Chat : 1 ml par 10 Kg de PV.
A renouveler l'injection 24 à 48 h si nécessaire.

Contre indications

Animaux souffrant d'insuffisance rénale, de diabète, d'ostéoporose.
Parasitisme intense
Vache ou brebis au dernier tiers de gestation lorsqu'on ne désire pas l'induction de la parturition. Assurer une couverture antibiotique à large spectre en cas de maladie infectieuse.
Ne pas prolonger inutilement le traitement afin d'éviter la suppression de l'ACTH et par la suite, l'aplasie des surrénales.

Délais d'attente

Viandes et abats : 21 jours
Lait : 48 heures.

Conditions de Stockage

Conserver à l'abri de la lumière et à T < 25°C.

Présentation

Flacon de 50 ml.



N35