

FICHE SIGNALÉTIQUE
EQUEST® Gel Oral
(Moxidectine)

Composition:

Moxidectine	18.92 mg
Eau purifiéeqsp.....	1000 mg

Espèces concernées :

Equidés.

Indications thérapeutiques :

Affections à parasites sensibles à la moxidectine chez les équidés, traitement des infestations par :

- les grands strongles suivants :

Strongylus vulgaris (adultes et stades artériels), Strongylus edentatus (adultes et stades viscéraux), Triodontophorus brevicauda (adultes), Triodontophorus serratus (adultes), Triodontophorus tenuicollis (adultes).

- les petits strongles (adultes et stades larvaires, à l'exclusion des L3 inhibées) suivants :

Cyathostomum spp, Cylicocyclus spp, Cylicostephanus spp, Cylicodontophorus spp, Gyallocephalus spp,

- les ascaridés suivants : Parascaris equorum (adultes et stades larvaires)

- les autres espèces suivantes :

Oxyuris equi (adultes et stades larvaires), Habronema muscae (adultes), Gasterophilus intestinalis (L2 et L3), Gasterophilus nasalis (L2 et L3), Stroglyoides westeri (adultes), Trichostrongylus axei.

Posologie usuelle, mode et voie d'administration :

Voie orale. Dose unique de 400 µg de moxidectine par kg de poids vif. Administrer le gel au moyen d'un applicateur calibré par 25 kg de poids vif. Estimer le poids de l'animal à traiter (balance, ruban gradué) pour déterminer la posologie adaptée. Tous les animaux d'un groupe doivent être traités.

Contre-indications :

Ne pas administrer chez les jeunes poulains de moins de 4 mois. Ne pas administrer en cas d'hypersensibilité connue au principe actif, aux autres milbémycines ou aux excipients du médicament.

Délai de validité :

24 mois dans son emballage commercial, à température inférieure à 25°C.

6 mois après ouverture.

Désignation des tableaux éventuels :

Liste C. Usage vétérinaire. A ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée durant le délai d'attente du médicament.