

# VACCINS AVIAIRES



## IZOUAC AVIFLU

### Vaccin inactivé contre la grippe aviaire

#### Composition

Vaccin inactivé sous forme huileuse contre l'Influenza aviaire H9N2.

#### Indications

Immunsation active contre l'encéphalomyélite aviaire.

#### Posologie

Pour une utilisation sous-cutanée ou intramusculaire.

Poulets de chair : 0,2 ml par poussin d'un jour par voie sous-cutanée. Repro et pondeuses : 0,2 ml par oiseau jusqu'à 3 semaines d'âge. Revaccination à 16-18 semaines d'âge avec une dose de 0,5 ml en sous-cutanée/intramusculaire.

En cas d'épidémie grave, une vaccination supplémentaire devrait s'appliquer à environ 10 semaines d'âge (avec 1 dose de 0,5 ml).

#### Mode d'administration

Pour une utilisation sous-cutanée ou intramusculaire.

Poulets de chair : 0,2 ml par poussin d'un jour par voie sous-cutanée.

Repro et pondeuses : 0,2 ml par oiseau jusqu'à 3 semaines d'âge.

Revaccination à 16-18 semaines d'âge avec une dose de 0,5 ml en sous-cutanée/intramusculaire.

En cas d'épidémie grave, une vaccination supplémentaire devrait s'appliquer à environ 10 semaines d'âge (avec 1 dose de 0,5 ml).

#### Conditions de Stockage

24 mois dans son emballage d'origine à température entre +2 et +8°C.

Après l'ouverture des flacons, le produit doit être utilisé dans les 10 heures

#### Présentation

Boîte 10 flacons de 500ml.



**N73**