

ANTI-INFECTIEUX



Novamox 50

Poudre soluble Antibiotique

Composition

Amoxicilline (sous forme trihydrate)* 50,0 g
1 g d'amoxicilline base = 1,14 g d'amoxicilline trihydrate
Excipientq.s.p.... 100,0 g



Indications

Traitement des infections primaires et secondaires causées par les germes sensibles à l'amoxicilline :

- Volailles : Infections respiratoires, Colibacilloses, Salmonelloses.

Prévention en milieu infecté des entérites nécrosantes à Clostridium perfringens sensibles à l'amoxicilline.

- Veaux: Diarrhées bactériennes, pneumonie du veau.

Posologie

Voie orale, à diluer dans l'eau de boisson :

La posologie de base est de 20 mg d'amoxicilline /kg de poids vif par 24 heures (en deux prises) soit 40 mg de NOVAMOX 50 /kg P.V/jour. (40 mg de NOVAMOX 50 par 10 litres d'eau de boisson). La durée de traitement est de 5 jours consécutifs. Dans les cas sévères la posologie peut être doublée.

Contre indications

- Intolérance aux pénicillines.

- Ne pas administrer aux poules pondeuses dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.

- Ne pas administrer aux lapins et aux cobayes.

- Ne pas utiliser chez les animaux présentant des troubles de la fonction rénale.

Délais d'attente

Viande et abats : 2 jours après la dernière administration

Œufs : Interdit chez les volailles pondeuses.

Conditions de Stockage

- Conserver le produit dans l'emballage commercial à une T° ≤ 25°C et une Humidité relative de 60%.

- 3 semaines après la 1ère ouverture du flacon.

- La solution médicamenteuse doit être consommée dans les 6 heures suivant la mise en solution du produit.

Interactions médicamenteuses, Précautions particulières d'emploi, utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte, Surdosage : voir notice

Présentation

Sachet de 100g et 1Kg.