

ANTISEDAN SOLUTION INJECTABLE

Composition

Atipamézole hydrochloride 5 mg

Soit équivalent à 4,27 mg d'Atipamézole base.

Indications

Antagonisme spécifique des effets sédatifs et autres de la médétomidine ou de la dexmédétomidine chez les chiens et les chats.

Mode d'administration et posologie

Voie intramusculaire ou sous-cutané. L'effet commence plus rapidement après une administration IM. Le dosage peut être répété si nécessaire. L'Antisedan est administré 15 à 60 minutes après la médétomidine ou la dexmédétomidine. Le retour à l'état normal se fait en 5 ou 10 minutes.

CHIENS : La dose d'antisédan calculée en millilitres est la même que la dose de médétomidine 1 mg/ml ou de desmédétomidine 0,5 mg/ml. La dose d'antisédan en millilitres correspond au cinquième (1/5) de la dose de dexmédétomidine 0,1 mg/ml. Indiquée en milligrammes, la dose d'atipamézole est 5 fois celle de la médétomidine ou dix (10) fois celle de la dexmédétomidine.

CHATS : la dose d'Antisedan calculée en millilitres est la moitié de la dose de médétomidine 1 mg/ml ou de dexmédétomidine 0,5 mg/ml et un dixième (1/10) de la dose de dexmédétomidine ou cinq (5) fois celle de la dexmédétomidine.

L'Antisedan peut également être utilisé pour réveiller l'animal après une anesthésie générale avec une combinaison de médétomidine et de kétamine ou de dexmédétomidine.

L'Antisedan peut également être utilisé pour réveiller l'animal après une anesthésie générale avec une combinaison de médétomidine et de kétamine ou de dexmédétomidine et de kétamine ou de dexmédétomidine et de kétamine. Dans ce cas, la dose d'Antisedan est la même que lors du réveil après sédation uniquement. L'injection d'Antisedan peut être administrée au plus tôt 30 à 40 minutes après l'injection de kétamine.

CHIEN :

Médétomidine Dose de 1 mg/ml	Dexmédétomidine Dose de 0,5 mg/ml	Antisedan Dose
1000 mcg/m ²	500 mcg/m ²	5000 mcg/m ²
40 mcg/kg	20 mcg/kg	200 mcg/kg
0,4 ml/10kg	0,4 ml/10kg	0,4 ml/10kg

CHAT:

Médétomidine Dose de 1 mg/ml	Dexmédétomidine Dose de 0,5 mg/ml	Antisedan Dose
80 mcg/kg	40 mcg/kg	200 mcg/kg
0,4 ml/5kg	0,4 ml/5kg	0,4 ml/5kg
		0,1 ml/3kg

*Chez les chats pesant plus de 3 kg, l'utilisation de dexmédétomidine 0,5 mg/ml de produit est recommandée.

L'Antisedan peut également être utilisé pour réveiller l'animal après une anesthésie générale avec une combinaison de médétomidine et de kétamine ou de dexmédétomidine et de kétamine. Dans ce cas, la dose d'Antisedan est la même que lors du réveil après sédation uniquement. L'injection d'Antisedan peut être administrée au plus tôt 30 à 40 minutes après l'injection de kétamine.

Contre-indication

Aucune

Délai d'attente

Sans objet

Conditions de stockage

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C. Ne pas congeler.

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 28 jours.

Présentation

Flacon de 10 ml

