

**ANTI-PARASITAIRE**

## LEVOXIN

### Suspension buvable

#### Composition

Oxyclosanide .....6,00 g  
Lévamisole (sf. Chlorhydrate)..... 3,00 g

#### Indications

Traitement des nématodes gastro-intestinales et pulmonaires. Traitement de la fasciolose (Stades adultes de la douve du foie (*Fasciola hepatica*)). Elimination des segments de taenia (*Moniezia spp.*)

#### Posologie

Administration orale avec une seringue graduée ou un pistolet drogueur en dose unique. LEVOXIN est recommandé à la posologie de base de : 15 mg d'oxyclosamide par kg de poids vif et 7,5 mg de lévamisole/kg de poids vif. Soit 2,50 ml de LEVOXIN suspension/10kg de poids vif.

#### Contre-indication

Ne pas utiliser chez les insuffisants rénaux ou hépatiques.  
Ne pas utiliser chez les femelles laitières dont le lait ou ses dérivés sont destinés à la consommation humaine.  
Ne pas administrer simultanément avec le pyrantel, morantel ou phosphate organique.  
Ne pas utiliser chez les équidés.

#### Délai d'attente

Viande et abats : 14 jours.  
Lait : Voir contre-indication.

#### Conditions de stockage

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.  
Tout flacon entamé, doit être utilisé en totalité.

#### Présentation

Flacon de 100ml, 250 ml, 500ml, 1 L et 5L.