

VANGUARD DAPP+L4+CV

LYOPHILISAT ET SUSPENSION POUR SUSPENSION INJECTABLE

Composition

Virus vivant atténué de la Maladie de Carré (souche N-CDV)// $\geq 10^{3.5}$ TCID₅₀*/Dose
 Adénovirus vivant Canin Type 2 (souche Manhattan) $\geq 10^{3.4}$ TCID₅₀/Dose
 Virus vivant modifié de Parainfluenza canin (souche NL-CPI-5) .. $\geq 10^{5.5}$ TCID₅₀/Dose
 Parvovirus vivant modifié canin (souche NL-35-D) $\geq 10^{7.2}$ TCID₅₀/Dose
 Leptospira Canicola (souche C-51) ≥ 600 NU**/Dose ≥ 1.20 RP
 Leptospira Grippotyphosa (souche MAL 1540) ≥ 600 NU/Dose ≥ 1.20 RP***
 Leptospira Icterohaemorrhagiae (souche NADL 11403)..... ≥ 600 NU/Dose ≥ 0.40 RP
 Leptospira Pomona (souche T262) ≥ 600 NU/Dose ≥ 1.20 RP
 Coronavirus canin (souche NL-18) 2.50 RP/dose

*TCID50 : dose infectant 50% des cultures cellulaires.

**NU: Unite Nephelometrique pre-inactivation.

***RP: Puissance (activité) Relative

Indications

Immunisation active des chiens contre la maladie de Carre, les adénoviroses, les affections respiratoires à Coronavirus, le Parainfluenza de type 2, la parvovirose, les leptospiroses à Leptospira Canicola, L. Grippotyphosa L. Icterohaemorrhagiae et L. Pomona.

Posologie

Mélanger aseptiquement le vaccin lyophilisé avec le flacon de vaccin liquide adjuvé. Bien agiter et administrer 1 ml par voie sous-cutanée ou intramusculaire.

Les chiens en bonne santé devraient recevoir 2 doses administrées à 3 semaines d'intervalle, suivies d'une dose unique de Vanguard CV 3 semaines plus tard.

Pour éviter le risque d'interférence avec les anticorps maternels, les chiens vaccinés à moins de 9 semaines devraient recevoir 3 doses du vaccin combiné, chacune administrée à 3 semaines d'intervalle. Une revaccination annuelle avec une dose unique est recommandée.

L'âge de vaccination préconisé est de 6 semaines.

Contre-indication

Aucune

Délai d'attente

Nul

Conditions de stockage

A conserver et transporter réfrigéré (entre 2°C et 8°C). Protéger de la lumière. Ne pas congeler.

Présentation

Flacon de 1 doses de lyophilisat et 1 flacon de 1ml de diluent.

Boîte de 25 flacons de 1 dose de lyophilisat et 25 flacons de 1 ml de diluent.

