

VANGUARD FELINE RCP+CH

LYOPHILISAT ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE

Composition

Virus de la rhinotrachéite féline (souche FVRm)	$\geq 10^{6,2}$ TCID ₅₀ & $\leq 10^{7,7}$ TCID ₅₀
Calicivirus félin (souche F-9)	$\geq 10^{6,7}$ TCID ₅₀ & $\leq 10^{8,2}$ TCID ₅₀
Virus de la panleucopénie infectieuse du chat (souche Snow leopard)	$\geq 10^{3,5}$ TCID ₅₀ & $\leq 10^{5,0}$ TCID ₅₀
Chlamydia psittaci féline (souche baker)	$\geq 10^{3,9}$ TCID ₅₀ & $\leq 10^{5,2}$ TCID ₅₀

TCID50 : dose infectant 50% des cultures cellulaires.

Indications

Vaccination de chats en bonne santé comme aide à la prévention de la rhinotrachéite virale féline causée par le virus de l'herpes félin-1, la maladie respiratoire causée par le calicivirus félin, la panleucopénie causée par le parvovirus félin et la chlamydie féline causée par Chlamydia psittaci.

Posologie

Vanguard Feline RCP+CH est destiné à la vaccination de chats en bonne santé âgés de 12 semaines ou plus comme aide à la prévention contre la rhinotrachéite virale féline (FVR) causée par l'herpèsvirus félin-1, les maladies respiratoires félines causées par le calicivirus félin (FCV), la panleucopénie féline (FPL) causée par le parvovirus félin et la chlamydie féline (pneumonie) causée par Chlamydia psittaci.

Instructions générales : La vaccination est recommandée pour les chats en bonne santé. Réhydratez de manière aseptique le vaccin lyophilisé avec le diluant stérile fourni, bien agitez et administrez 1 ml par voie intramusculaire ou sous-cutanée.

Primo-vaccination : les chats en bonne santé âgés de 12 semaines ou plus devraient recevoir 2 doses administrées 3 à 4 semaines d'intervalle. Les chats vaccinés à moins de 12 semaines devraient être revaccinés à l'âge de 12 semaines.

Rappel annuel : La revaccination annuelle avec une seule dose est recommandée.

Contre-indication

Des seringues et des aiguilles stériles devraient être utilisées pour administrer ce vaccin. Ne pas stériliser avec des produits chimiques car des traces de désinfectant peuvent inactiver le vaccin.

Délai d'attente

Nul

Conditions de stockage

A conserver et transporter réfrigéré (entre 2°C et 8°C). Protéger de la lumière. Ne pas congeler.

Présentation

Flacon de 1 doses de lyophilisat (boîte de 25) et 1 flacon de 1ml de diluent (boîte de 25).