

ANTI-INFECTIEUX

BETAMOX LA



### Suspension injectable d'amoxicilline

#### Composition

Amoxicilline (s/f trihydrate)	150 mg
Excipient qsp	1 ml

#### Espèces cibles

Bovins, ovins, caprins, porcins, chien et chat.

#### Indications

Infections causées par les germes sensibles à l'Amoxicilline chez les bovins, ovins, caprins, porcins, chien et chat.

#### Posologie

Administrer 1ml /10kg de PV en IM profonde.

#### Contre indications

Voie intraveineuse et voie péritonéale. Hypersensibilité à l'amoxicilline. Sujets atteints de problèmes hépatiques ou rénaux.

#### Délais d'attente

Viandes et abats : Vaches : 23 jours ; Moutons : 16 jours .Lait : 79 heures.

#### Précautions

Ne pas diluer le produit. Si un traitement concomitant est administré, utiliser un site d'injection différent. Laver les mains après utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement avec de l'eau. Utiliser le produit dans les 28 jours après l'ouverture du flacon. Une fois exposée à l'air, la solution peut noircir, mais la teneur reste inchangée.

#### Conditions de Stockage

Conserver en dessous de 25°C à l'abri de la lumière.

#### Présentation

Flacons de 50 ml et 100 ml.



N04