

ANTIPARASITAIRES



CLOVER

Solution orale Antiparasitaire

Composition

Closantel (s.f. sodique dihydratée)	5 g
Ivermectine	0.1 g
Excipients q.s.p	100 ml

Indications

CLOVER est indiqué pour le traitement et la prévention des strongyloses gastro-intestinaux et pulmonaires, la fasciolose hépatique à *Fasciola Hepatica* (adultes et immatures), et l'oestrose ovine (*oestrus ovis*).

Posologie

CLOVER est administré par voie orale au pistolet drogueur ou à la seringue, à la dose de 2 ml par 10 Kg de poids vif.

La posologie de base est de 10 mg de Closantel et 200 µg d'ivermectine par kg PV.

Contre indications

Ne pas administrer aux femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine.

Ne pas administrer chez les femelles 28 jours avant la mise bas.

Précautions éventuelles :

Bien agiter avant emploi

Bien respecter la posologie recommandée

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Délais d'attente

Viande et abats : 28 jours

Lait : voir rubrique « contre indications ».

Conditions de Stockage

Clover doit être à l'abri de la chaleur à une température inférieure à 25°C.

Présentation

Flacon de 250 ml, 500 ml, bidons de 1 L et de 5 L.

