

ANTI-INFECTIEUX



COLIFLOX

### Solution Orale

#### Composition

Enrofloxacin	10,0 g
Colistine sulfate	100 M U I
Excipients qsp	1000 ML

#### Indications

Traitement et prévention des infections à germes sensibles à l'association colistine-enrofloxacin chez les espèces cibles, notamment :

- Les maladies respiratoires chroniques (MRC) dues aux Mycoplasmes, Pasteurelles et Haemophilus.
- Les gastro-entérites infectieuses telles que les colibacillooses et les salmonelloses.

#### Posologie

Administration par voie orale dans l'eau de boisson chez la volaille selon la posologie suivante: La posologie de base est de 100 000 UI de Colistine sulfate par kg de poids vif et de 10 mg d'Enrofloxacin par kg de poids vif par jour, soit environ 1 ml de COLIFLOX par 10 kg de poids vif et par jour pendant 3 à 5 jours consécutifs, l'équivalent de 1 Litre de COLIFLOX /tonne d'eau de boisson.

#### Contre indications

- Ne pas administrer chez les poules pondeuses dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.
- A ne pas administrer en cas de résistance aux autres quinolones

#### Délais d'attente

Viandes et abats : 7 jours - Œufs : voir contre indications

#### Conditions de Stockage

- Conserver le produit dans l'emballage commercial à une T° ≤ 25°C et une Humidité relative de 60%.
- 3 semaines après la 1ère ouverture du flacon.
- La solution médicamenteuse doit être consommée dans les 6 heures suivant la mise en solution du produit.

#### Présentation

Flacons de 250 ml, de 500 ml et de 1 litre, Bidons de 5 litres.



N07