

## ANTIPARASITAIRES

### DORAVET



### Solution injectable Antiparasitaire interne et externe

#### Composition

DORAMECTINE		10,00 mg
Excipients	q.s.p	1,0 ml

#### Indications

**Bovins :** traitement et contrôle prolongé des infestations par : Les nématodes gastro-intestinaux (adultes et immatures) ; Les nématodes pulmonaires (adultes et immatures) ; les nématodes des yeux ; les Hypodermes ; les poux piqueurs et broyeurs et les acariens responsables de gales.

**Ovins :** traitement des infestations par : Les nématodes gastro-intestinaux (L4 et adultes); Les nématodes pulmonaires ; larves d'Oestrus ovis et les acariens responsable de gales psoroptiques.

**Equins :** Strongyloïdiose à strongyloïdes westerii ; Strongyloïdiose à strongylus equines, strongylus vulgaris; strongylus edentatus; gasterophilose, habronemose et tricostrongylose à tricostrongylus axei

#### Posologie

Par voie injectable administré dans la région du cou par voie sous-cutanée chez les bovins et par voie intramusculaire chez les ovins et les équins

Posologie de base : 0,2 mg/kg PV soit 1ml de DORAVET 1 % par 50 Kg de PV en dose unique.

#### Contre indications

Ne pas administrer aux femelles laitières, en lactation ou en période de tarissement, productrices de lait pour la consommation humaine, ni chez les femelles gestantes 2 mois avant la mise bas.

#### Délais d'attente

**Bovins :** Viandes et abats = 42 jours,

**Ovins :** Viandes et abats = 70 jours

**Lait :** Ne pas utiliser chez les vaches et brebis laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine, ni chez les vaches et brebis en période de tarissement ou chez les génisses et les brebis laitières gravides dans les 70 jours avant le vêlage.

#### Conditions de Stockage

24 mois dans son emballage commercial, à une température < 25 °C et à l'abri de la lumière.

28 jours après sa première ponction.

#### Présentation

Flacon de 50ml.



N52