

ANTI-INFECTIEUX

Doxynova



**Poudre soluble
Antibiotique à large spectre**

Composition

Doxycycline (s / f hyclate) 5,00 g
Excipient q.s.p 100 g

Indications

Traitement et prévention des germes sensibles à la Doxycycline chez les Volailles et les Veaux.

Volailles : Prévention et traitement des affections respiratoires.

Veaux : Traitement et prévention des affections respiratoires et digestives.

Posologie

Voie orale, à diluer dans l'eau de boisson ou l'aliment liquide.

Veaux : 10 mg de doxycycline / kg PV et par jour, soit 1 g de DOXYNOVA pour 5 kg de poids vif par jour

Volailles : 0 à 15 jour d'âge : 1 g de DOXYNOVA par litre d'eau de boisson et par jour (soit 50 ppm)

> 15 jours d'âge : 2 g de DOXYNOVA par litre d'eau de boisson et par jour (100 ppm).

Durée du traitement :

Prévention : 1 à 3 jours consécutifs.

Traitement : 3 à 5 jours consécutifs.

Contre indications

- Ne pas administrer chez les bovins à rumen fonctionnel dont la voie orale est peu efficace

- Ne pas administrer aux poules pondeuses dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.

Délais d'attente

Veaux : Viandes et abats : 14 jours.

Viandes de volailles: 04 jours.

Palmipèdes, dindes, dindons : 06 jours.

Conditions de Stockage

A l'abri de la chaleur.

Présentation

Sachets 1Kg et 100 g.



N10