

VACCINS AVIAIRES

IZOUAC CLONE



Vaccin vivant lyophilisé contre la Maladie de Newcastle

Composition

Chaque dose du vaccin contient :

- virus atténué de la Maladie de Newcastle souche Clone > 10⁶EID₅₀

Indications

Immunisation contre la Maladie de Newcastle.

Posologie

Administrer par instillation oculaire, nébulisation ou dans l'eau de boisson.

La première administration: 1 jour d'âge (nébulisation ou instillation oculaire).

La deuxième administration: 2 à 3 semaine après.

Le rappel: chaque 2-3 mois chez la pondeuse et le reproducteur

| | Age des animaux | | |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| | 1-15 j | 15-30 j | >30 j |
| Instillation oculaire | 30 ml | 30 ml | 30 ml |
| Nébulisation | 500 ml | - | - |
| Eau de boisson | 5-10 l | 10-20 l | 20-40 l |

Mode d'administration

Vaporisation: Utiliser un nébulisateur qui produit des gouttelettes de 50 Microns.

Nébuliser à 1 mètre de distance des animaux.

Dans l'eau de boisson:

1- suspendre l'administration d'eau de boisson 2-3 heures avant la vaccination.

2- Les abreuvoirs doivent être vides, propres et ne contenant pas d'aliments, fèces ou traces de désinfectants.

3- après détermination du nombre des animaux à vacciner, préparer dans un container propre (sans désinfectant) la quantité d'eau nécessaire pour l'administration du vaccin.

4- tous les animaux doivent avoir accès aux abreuvoirs au même temps.

5- La dilution finale dans l'eau de boisson doit être effectuée rapidement

6- l'eau de boisson doit être épuisée dans une période de 1 à 2 heures.

7- ne pas exposer l'eau contenant le vaccin à des sources de chaleur .

8- utiliser une eau ne contenant pas de chlore ou des traces de désinfectant.

9 - le lait en poudre écrémé peut être ajouté dans l'eau de boisson (2 à 3 g/l).

Délais d'attente

Aucun.

Conditions de Stockage

Stocker à des températures de +2 à +6°C.

Ne pas congeler.

Présentation

Flacon de 1000 doses. Boîte de 10 flacons de 1000 doses.



N64