

VACCINS AVIAIRES

IZOVAC IB H120



Vaccin vivant lyophilisé contre la Bronchite Infectieuse

Composition

- virus vivant atténué de la Bronchite Infectieuse souche Massachusetts H120 > 10³ EID⁵⁰

Indications

Immunisation active contre la Bronchite Infectieuse.

Posologie

Administrer par goutte oculaire, par nébulisation ou dans l'eau de boisson.

Première administration : par nébulisation ou goutte à l'œil, en ½ dose.

Seconde administration : 2 à 3 semaines après la première vaccination.

Le rappel : chaque 2 à 3 mois chez les pondeuses et les reproducteurs.

Mode d'administration

Nébulisation : Nébuliser à 1 mètre de distance des oiseaux.

Utiliser les nébuliseurs qui produisent des gouttelettes de 50 microns environ

Goutte à l'œil : Administrer une goutte dans un œil à l'aide d'un compte gouttes.

La quantité d'eau ou de diluant (gouttes oculaires) utilisée pour 1000 doses sont :

Age des animaux	1 - 15 j	15 - 30 j	30 j
Goutte à l'œil	30 ml	30ml	30ml
Nébulisation	500ml	-	-
Via Eau de boisson	5-10 L	10-20L	20-40L

Eau de boisson

1- suspendre l'administration d'eau de boisson 2-3 heures avant la vaccination.

2- les abreuvoirs doivent être vides, propres et sans traces de désinfectants.

3- après détermination du nombre des animaux à vacciner, préparer dans un container propre (sans désinfectant) la quantité d'eau nécessaire pour administration du vaccin.

4- tous les animaux doivent avoir accès aux abreuvoirs en même temps.

5- la reconstitution du vaccin, la dilution finale dans l'eau de boisson et l'administration doivent être effectuées dans un temps très bref.

6- l'eau de boisson contenant le vaccin doit être épuisée dans une période de 1 à 2 heures.

7- ne pas exposer l'eau contenant le vaccin à des sources de chaleur (lampes d'incubation, soleil ou autre) ou une lumière intense.

8- utiliser une eau ne contenant pas de chlore ou des traces de désinfectant.

9- le lait en poudre écrémé peut être ajouté dans l'eau de boisson (2 à 3 g/l).

Délais d'attente

Aucun.

Conditions de Stockage

Stocker à des températures de +2 à +6°C.

Ne pas congeler.

Présentation

Flacon de 1000 doses. Boite de 10 flacons de 1000 doses.



N72