

VACCINS AVIAIRES

IZOUAC ND FLU



Vaccin inactivé contre la grippe aviaire et Newcastle

Composition

Vaccin inactivé sous forme huileuse contre l'Influenza aviaire H9N2 et la maladie de Newcastle souche Ulster.

Indications

Pour l'immunisation active des poulets contre la grippe de type A, sous-type H9 et la maladie de Newcastle.

Posologie et Mode d'administration

Pour une utilisation sous-cutanée ou intramusculaire.

Poulets de chair : 0,2 ml par poussin à jour par voie sous-cutanée

repro et pondeuses : 0,2 ml par oiseau jusqu'à 3 semaines d'âge. Revaccination à 16-18 semaines d'âge avec une dose de 0,5 ml en sous-cutanée/intramusculaire.

En cas d'épidémie grave, une vaccination supplémentaire devrait s'appliquer à environ 10 semaines d'âge (avec 1 dose de 0,5 ml).

Délais d'attente

Aucun.

Contre-indications

Ne pas administrer par voie intramusculaire chez les poulets de moins de 3 semaines d'âge.

Conditions de Stockage

Stocker à des températures de +2 à +6°C.

Ne pas congeler.

Présentation

Flacons de 50 ml et 100 ml.



N70