

ANTIPARASITAIRES

LEVAPHEN



Poudre orale de levamisole

Composition

Chlorhydrate de LEVAMISOLE	20 g
Excipient q.s.p	100g

Indications

Chez les volailles : traitement de la capillariose, de l'hétérakidose et de l'ascaridiose.
Chez les ruminants : traitement des strongyloses gastro-intestinales et pulmonaires.

Posologie

voie orale, à diluer dans l'eau de boisson ou l'aliment liquide.

- Volaille : 10 g de Levaphen /100 g de PV (soit en moyenne 1 g/litre d'eau de boisson).
- Ruminants : 0.4 g de Levaphen /10 Kg de PV (dissoudre le contenu d'un sachet de 100 g dans 1 litre d'eau, bien agiter et administrer 4 ml/10 Kg PV).

Contre indications

Equidés.

Femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine.

Poules pondeuses dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.

Association aux organophosphorés et aux spécialités contenant le citrate de diéthylcarbama-
zine.

Délais d'attente

Viandes et abats : 7jours.

Conditions de Stockage

Dans l'emballage d'origine à l'abri de la chaleur.

Présentation

Sachets 100g et 500 g.



N54