

ANTI-INFECTIEUX



NEOFENICOL 20

### Solution orale Anti-infectieux

#### Composition

Florfenicol	20,0 g
Colorant jaune orange (E 110)	20,0 mg
Méthylparaben Sodique	0,20 g
Excipient q.s.p	100,0 ml

#### Indications

Prévention et traitement des infections à germes sensibles au florfenicol chez la volaille: Colibacillose, MRC, Salmonellose, Mycoplasmoses, Omphalites, Coryza infectieux et Pasteurellose (Choléra aviaire).

#### Posologie

Administration par voie orale dans l'eau de boisson:

Posologie de base est de 20 mg de florfenicol / kg de poids vif, soit : 10 ml de NEOFENICOL 20% par 100 kg P.U. équivalent à 1 litre de NEOFENICOL 20% par 1000 litres d'eau de boisson pendant 3 à 5 jours.

#### Contre indications

Ne pas administrer aux volailles pondeuses d'œufs destinés à la consommation humaine.

#### Délais d'attente

Volailles : 05 jours.

Œufs: voir contre-indication.

#### Conditions de Stockage

Conserver dans l'emballage commercial, à une température ne dépassant pas 25°C.  
3 mois après 1ère ouverture du flacon.

La solution médicalisée doit être renouvelée toutes les 24 heures.



#### Présentation

Flacons de 250ml, 500ml, 1000 ml et bidons de 5 L.

N19