

SIMPARICA

Comprimés à croquer pour chiens

Composition :

Sarolaner

Le sarolaner est un acaricide et un insecticide appartenant à la famille des isoxazolines.

| Simparica comprimés à croquer | Sarolaner (mg) |
|-------------------------------|----------------|
| pour chiens > 5 – 10 kg | 20 |
| pour chiens > 10 – 20 kg | 40 |
| pour chiens > 20 – 40 kg | 80 |

Espèces cibles :

Chiens

Indications thérapeutiques :

-Traitement des infestations par les tiques (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes hexagonus*, *Ixodes ricinus* et *Rhipicephalus sanguineus*). Ce médicament vétérinaire a une activité acaricide immédiate et persistante sur les tiques pendant au moins 5 semaines.

-Traitement des infestations par les puces (*Ctenocephalides felis* et *Ctenocephalides canis*). Ce médicament vétérinaire a une activité insecticide immédiate et persistante contre les nouvelles infestations de puces pendant au moins 5 semaines. Ce médicament vétérinaire peut être utilisé dans le cadre d'un plan de traitement de la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP). Afin d'être exposées à la substance active, les puces et les tiques doivent être présentes sur l'animal et avoir commencé à se nourrir.

-Traitement de la gale sarcoptique (*Sarcoptes scabiei*).

-Traitement de la gale des oreilles (*Otodectes cynotis*).

-Traitement de la démodécie (*Demodex canis*),

Voie d'administration et posologie :

Administer par voie orale le Simparica en une seule prise.

Programme de traitement :

- Pour un contrôle optimal de l'infestation par les puces et les tiques, le médicament vétérinaire doit être administré à intervalles mensuels de façon continue tout au long de la saison des puces et/ou des tiques, selon la situation épidémiologique locale.

- Pour le traitement de la gale sarcoptique (causée par *Sarcoptes scabiei* var. *canis*) une dose unique doit être administrée pendant deux mois consécutifs, à un mois d'intervalle.

- Pour le traitement de la gale des oreilles (*Otodectes cynotis*), une dose unique doit être administrée. Une visite de contrôle chez le vétérinaire 30 jours après l'application est conseillée car une seconde application peut être nécessaire chez certains chiens.

- Pour le traitement de la démodécie (due à *Demodex canis*), l'administration d'une dose unique tous les mois pendant 3 mois consécutifs est efficace et permet une amélioration significative des signes cliniques. Dans tous les cas, il est essentiel de poursuivre le traitement jusqu'à ce que les raclages cutanés soient négatifs au moins 2 fois consécutives à un mois d'intervalle. La démodécie étant une affection multi-factorielle, il est recommandé, lorsque cela est possible, de traiter également de manière appropriée la pathologie sous-jacente.

Présentation :

Boîte de 3 comprimés.