

la Gazette de NOVOVET



GRAND FROID: BRONCHOPNEUMONIE ET DYSENTÉRIE HIVERNALE CHEZ LE VEAU

L'hiver est propice aux développements de pathologies néonatales dans les cheptels bovins. Surtout si les changements atmosphériques sont brutaux! En effet, le passage d'une température clémente à un climat froid et humide accompagné de l'introduction d'animaux de l'extérieur en période d'hivernage sans mise en quarantaine sont des facteurs de risque d'émergence de bronchopneumonies et de dysentéries chez les veaux. Les antibiotiques restent incontournables pour une guérison rapide et complète des animaux.



Produit du mois

L'enrofloxacin est active non seulement contre les pasteurelles mais aussi sur les mycoplasmes et les colibacilles qui peuvent surinfecter le veau malade.

Les paramètres pharmacocinétiques des fluoroquinolones, soient une bonne diffusion intra et extra-cellulaire, leur permettent une bonne pénétration et biodisponibilité tissulaire et cellulaire.

NOVOTRYL injectable est utilisé pour le traitement des:

- Bronchopneumonies et des pneumonies
- Infections articulaires
- Mammites aiguës
- Métrite et rétention placentaire
- Entérite



NOVOTRYL INJ

NOVOTRYL injectable est:

Un bactéricide

- Sur germes en phase multiplication
- Concentration-dépendant pour les G-
- Temps-dépendant pour les G+

Présentations

**Disponible en flacon ambré de
50 et 100 ml**



Solution injectable

Composition

Enrofloxacin 10,00 g
Excipient 100 ml

Espèces cibles

Bovins, ovins, caprins, équins, porcins, chiens et chats

Indications

Chez les bovins, ovins caprins et équins: Traitement des infections respiratoires Bronchopneumonies, pneumonies, Traitement des infections articulaires à Mycoplasma bovis, Traitement des mammites aiguës, métrites, entérites et rétention placentaire.
Chez les porcins:- Traitement des infections respiratoires à Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae et Actinobacillus pleuropneumoniae. Traitement des infections urinaires, dues à Escherichia coli. Chez les chiens et chats:- Traitement des infections respiratoires, uro-génitales (cystite urinaire), cutanées (plaies et abcès), Traitement et prévention de l' Ehrlichiose canine

Posologie

Bovins, Ovins, Caprins, chiens et chat : 5 mg d'enrofloxacin par kg de PV et par jour, soit 0,5 ml de la solution NOVOTRYL injectable /10 kg de PV/ jour pendant 4 à 5 jours consécutifs. Porcins et équins : 2,5 à 5 mg d'enrofloxacin par kg de PV/j en IM profonde pendant 3 à 4 jours consécutifs, soit 0,25 à 0,5 ml de la solution NOVOTRYL injectable pour 10 kg de PV/ j pendant 3 à 4 jours.

Contre indications

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue aux fluoroquinolones ; Ne pas traiter les truies gestantes à fortes doses.

Délais d'attente

Viande et abats : 12 jours, Lait : 4 jours (08 traites).

Conditions de Stockage

25 °C+2 ° ; 65% HR+ 5 %. 28 jours après 1ère ponction.



40, Lot Batoul, Lissasfa, Casablanca,
Maroc

Phone: +(212) 05 22 93 09 21

E-mail: info@laboratoiresnovovet.com

**Accédez à votre compte client
sur notre site officiel:
<http://www.laboratoiresnovovet.com/>**

