

## STRONGHOLD PLUS

### SOLUTION POUR SPOT ON

#### Composition

	Contenue de la pipette (ml)	Selamectin (mg)	Sarolaner (mg)
Stronghold Plus chats < 2,5 kg	0,25 ml	15	2,5
Stronghold Plus chats 2,5-5 kg	0,5 ml	30	5
Stronghold Plus chat 5-10 kg	1 ml	60	10

#### Indications

##### Posologie

Pour les chats atteints ou exposés au risque d'infestations parasitaires mixtes par les tiques et les puces, les poux, les acariens responsables de la gale des oreilles, les nématodes gastro-intestinaux ou les filaires cardiaques. Ce médicament vétérinaire est indiqué exclusivement en cas d'utilisation contre les tiques ainsi qu'un ou plusieurs autres parasites cibles de manière simultanée.

##### Ectoparasites :

Traitement et prévention des infestations par les puces (*Ctenocephalides* spp.). Ce médicament vétérinaire a une activité insecticide immédiate et persistante contre les nouvelles infestations de puces pendant 5 semaines. Le produit tue les puces adultes avant la ponte des œufs pendant 5 semaines. Grâce à son activité ovicide et larvicide, ce médicament vétérinaire contribue au contrôle des infestations de puces existant dans l'environnement, dans les zones auxquelles l'animal a accès.

- Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique contre la Dermatite Allergique aux Piqures de Puces (DAPP).

Traitement des infestations par les tiques. Le médicament vétérinaire a un effet acaricide immédiat et persistant pendant 5 semaines contre *Ixodes ricinus* et *Ixodes hexagonus*, et 4 semaines contre *Dermacentor reticulatus* et *Rhipicephalus sanguineus*.

- Traitement de la gale des oreilles (*Otodectes cynotis*).
- Traitement des infestations par les poux broyeurs (*Felicola subrostratus*).

Afin d'être exposées au sarolaner, les tiques doivent être présentes sur l'animal et avoir commencé à se nourrir.

##### Nématodes:

- Traitement des ascaridoses intestinales dues aux formes adultes des ascaris (*Toxocara cati*) et des ankylostomoses intestinales dues aux formes adultes des ankylostomes (*Ancylostoma tubaeforme*).
- Prévention de la dirofilariose due à *Dirofilaria immitis* par administration mensuelle du médicament.

**Nématodes :**

-Traitement des ascaridioses intestinales dues aux formes adultes des ascaris (*Toxocara cati*) et des ankylostomidoses intestinales dues aux formes adultes des ankylostomes (*Ancylostoma tubaeforme*).

-Prévention de la dirofilariose due à *Dirofilaria immitis* par administration mensuelle du médicament.

**Contre-indication**

Ne pas utiliser sur des chats atteints de maladies concomitantes, ou affaiblis et d'un poids insuffisant (pour leur taille et leur âge).

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au principe actif, ou à l'un des excipients.

**Délai d'attente**

Sans objet

**Conditions de stockage**

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

**Présentation**

Flacon de 0,25 ml, 0,5 ml et 1 ml.

