

EQUEST PRAMOX

GEL ORAL

Composition

Moxidectine	19,5 mg
Praziquantel	121,5 mg

Indications

Chez les chevaux, traitement des infestations mixtes par les cestodes, les nématodes ou les arthropodes (provoquées par les souches) sensibles à la Moxidectine et au Praziquantel.

Grands strongles : *Strongylus vulgaris* (stades adultes), *Strongylus edentatus* (stades adultes), *Tridontophorus brevicauda* (adultes), *Tridontophorus serratus* (adultes), *Tridontophorus tenuicollis* (adultes)

Petits strongles (stade adulte et stade larvaire intraluminal) : *Cyathostomum* spp, *Cylicocyclus* spp, *Cylicostephanus* spp, *Cylicodontophorus* spp, *Gyalocephalus* spp
Ascarides: *Parascaris equorum* (stade adulte)

Autres espèces : *Oxyuris equi* (adulte), *Habronema muscae* (adulte), *Gasterophilus intestinalis* (L2, L3), *Gasterophilus nasalis* (L2, L3), *Strongyloides westeri* (adulte), *Trichostrongylus axei* (adulte), Plathelminthes (adulte) : *Anoplocephala perfoliata*, *Anoplocephala magna*, *Paranoplocephala mammillana*

L'excrétion des oeufs des petits strongles est supprimée pendant 90 jours.

Le médicament vétérinaire est actif contre les stades larvaires L4 enkystés (en développement) des petits strongles. 8 semaines après le traitement, les stades larvaires L3 (en hypobiose) des petits strongles sont éliminés.

Posologie

Une dose orale unique de 400 microgramme/kg de moxidectine et 2,5 mg de praziquantel/kg à l'aide de la seringue calibrée d'une graduation pour 25 kg de poids vif. Pour assurer l'administration d'un dosage correct, le poids corporel doit être déterminé aussi précisément que possible : l'exactitude du dosage doit être vérifiée. L'utilisation d'une balance ou d'un ruban de poids est recommandée pour assurer un dosage précis. Tenez la seringue avec le capuchon et pointant vers la gauche afin que vous puissiez voir le poids de l'animal. Une seringue graduée contient le traitement pour un cheval de 700 kg. Dans le cas d'un traitement pour cestodes, la dose de praziquantel dans le produit a été sélectionnée jusqu'à la fin de la plage de dosage. Des conseils vétérinaires doivent être donnés sur les programmes de dosage et la gestion des stocks appropriés pour obtenir un contrôle optimal des parasites.

Contre-indication

Ne pas administrer chez les poulains de moins de 6,5 mois.

Ne pas utiliser en cas de d'hypersensibilité au(x) substance(s) active(s) ou à l'un des excipients.

Le produit a été formulé spécifiquement pour une utilisation chez les chevaux. Les chiens et les chats peuvent présenter des effets indésirables dus à la concentration de la

moxidectine dans ce médicament s'ils ingèrent du gel répandu sur le sol ou s'ils ont accès à des seringues entamées.

Délai d'attente

Viande et abats : 64 jours.

Lait : non autorisé pour les juments productrices de lait destinée à la consommation humaine.

Conditions de stockage

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Présentation

Seringue HDPE contenant 14,4 g de gel avec un piston gradué en propylène et capuchon en LDPE.

